



# Om tablet- behandling mod covid-19

Få svar på nogle af de spørgsmål, du kan have om  
tabletbehandlingen mod covid-19.

16. december 2021

**For at være i målgruppen for behandling skal du:**

- Være testet positiv for covid-19 med PCR-test
- Være i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19\*
- Have symptomer på covid-19 og have haft symptomerne i højst 5 dage.

Hvis du kan nikke genkendende til alle tre punkter ovenfor, er du muligvis i målgruppen for tabletbehandlingen. Du bør derfor læse denne pjece og kontakte din læge hurtigst muligt, da behandlingen skal gives senest 5 dage efter, du har fået symptomer på covid-19 for at have effekt.

\*Læs mere på side 3

## Om tabletbehandlingen

Tabletbehandlingen mod covid-19 er en ny behandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med covid-19 hos personer med øget risiko. De rapporterede bivirkninger ved tabletterne er milde og forbigående.

Behandlingen er endnu ikke godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Sundhedsstyrelsen anbefaler, at patienter, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 påbegynder behandlingen, da det vurderes, at fordelene ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom er væsentlig og de rapporterede bivirkninger er milde.

## Hvordan får jeg tabletbehandling for covid-19?

Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du kan tilbydes tabletbehandling. Hvis du tænker, at du er i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge hurtigst muligt, da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Du kan læse mere om, hvem der er i målgruppen nedenfor. Hvis du ikke kan komme i kontakt med din læge inden for 5 dage efter dine symptomer startede, fx pga. weekend, kan du ringe til vagtlægen/1813 i din region.

## Hvem er i målgruppen for tabletbehandling for covid-19?

Det er din praktiserende læge som endeligt vurderer, om du er i målgruppen for behandlingen.

Følgende kriterier skal være opfyldt:

**1. Positiv PCR test for covid-19.**

Har du mistanke om, at du har covid-19, bør du altid blive testet med en PCR-test. En antigen-test (kviktest) er ikke tilstrækkelig i forhold til at komme i betragtning til tabletbehandling.

**2. Symptomer på covid-19 som har varet i højst 5 dage**

Har du ikke symptomer eller har dine symptomer varet længere end 5 dage, er du ikke i målgruppen for tabletbehandling.

**3. I øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i en af følgende grupper:**

- a. Du er 80 år eller ældre - uanset om du er vaccineret eller ej
- b. Du er uvaccineret og er mellem 65 og 79 år
- c. Du er uvaccineret og er 18 og 64 år og i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19. Det kan for eksempel være dig, som har:  
kronisk nyresvigt – alvorlig kronisk leversygdom – alvorlig hjertesygdom – er overvægtig – er i kræftbehandling – har et misbrug – har en anden alvorlig kronisk sygdom eller tilstand.
- d. Enkelte personer, som er vaccinerede og er under 80 år, kan også være i målgruppen for behandlingen. Det kan for eksempel være, hvis du har flere forskellige alvorlige sygdomme.

**Tabletbehandling må ikke anvendes under graviditet, men det er alligevel en god idé at kontakte din praktiserende læge, hvis du er gravid, og er testet positiv for covid-19, da der kan være anden relevant behandling til dig.**

## Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen består af fire kapsler to gange om dagen i 5 dage. Behandlingen skal senest startes 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Da du er testet positiv for covid-19, og derfor er i isolation, skal du ikke selv hente tabletterne på apoteket. I stedet kan du få en pårørende eller én du kender til at hente tabletterne til dig, eller du kan få dem bragt ud fra apoteket. Det er gratis at få tabletbehandlingen mod covid-19, men der er gebyr ved udbringning.

## Hvordan virker behandlingen?

Tabletbehandlingen virker ved at hæmme virus' evne til at dele sig.

Da det er en ny behandling, er der endnu ikke lavet mange store studier. Dog er der lavet et studie, hvor 709 patienter fik tabletbehandlingen og 699 fik en placebobehandling. I studiet fandt man at tabletbehandlingen nedsatte risikoen for indlæggelse og død med 30 %, blandt uvaccinerede patienter med risiko for alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Da studiet kun er udført blandt uvaccinerede, mangler der viden om behandlingen blandt vaccinerede. Alligevel anbefaler Sundhedsstyrelsen behandlingen til nogle personer som er vaccinerede. Det gør vi, fordi nogle personer, f.eks. personer der er 80 år eller ældre, har en høj risiko for indlæggelse, selvom de er vaccinerede.

Kvinder i den fødedygtige alder anbefales at anvende effektiv prævention under behandlingen. Amning skal afbrydes under behandlingen indtil 4 dage efter sidste tablet.

Selvom du får tabletbehandlingen, er det stadig vigtigt at kontakte din læge, hvis du udvikler svære symptomer, f.eks. vejrtrækningsbesvær.

## Hvad er bivirkningerne?

De hyppigst indberettede bivirkninger er diarré, kvalme, svimmelhed og hovedpine. Alle bivirkningerne var milde til moderate i studiet, som lægger til grund for Sundhedsstyrelsens anbefaling. Vi kender endnu ikke langtidsbivirkningerne.

Sikkerhed og bivirkninger ved lægemidlet overvåges nøje, og alle bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

## Hvor kan jeg læse mere?

<b>Fagligt notat vedr. behandling af covid-19 med orale antiviralia</b> Beskriver det faglige grundlag for anbefalingen	<a href="https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Fagligt-notat-vedr-behandling-af-covid-19-med-orale-antiviralia">https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Fagligt-notat-vedr-behandling-af-covid-19-med-orale-antiviralia</a>
<b>Fakta ark vedr. behandling med Lagevrio i almen praksis</b> Et kort ark som beskriver tabletbehandlingen til almen praksis.	<a href="https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Faktaark-behandling-med-Lagevrio-i-almen-praksis">https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Faktaark-behandling-med-Lagevrio-i-almen-praksis</a>
<b>Præparatanmeldelse Lagevrio</b> Detaljeret beskrivelse af tabletbehandlingen til almen praksis.	<a href="https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19">sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19</a>
<b>Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus</b> Beskriver, hvordan du skal forholde dig, når din test er positiv for ny coronavirus, og du således er smittet.	<a href="https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Anbefalinger/Anmeldelser-af-nye-laegemidler/Praeparatanmeldelser/Lagevrio">https://www.sst.dk/da/Viden/Laegemidler/Anbefalinger/Anmeldelser-af-nye-laegemidler/Praeparatanmeldelser/Lagevrio</a>
<b>Sundhedsstyrelsens hjemmeside</b> På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du få svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål om tabletbehandlingen	<a href="https://www.sst.dk/covid-tabletbehandling">www.sst.dk/covid-tabletbehandling</a>